



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 12. marts 2015
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMEER
Sags nr.: 1501238
Dok nr.: 1653888

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 25. februar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 555 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Daniel Rugholm (KF).

Spørgsmål nr. 555:

”Ministeren bedes oplyse, hvilke tiltag man vil sætte i værk for at få indblik i, om patienter i kommunal misbrugsbehandling i videst muligt omfang medicineres med den mest sikre medicin?”

Svar:

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet følgende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen:

”I Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling præciseres den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger skal udvise i håndteringen af de problemstillinger, der knytter sig til behandlingen af personer med et stofmisbrug.

I vejledningen er det anført, at læger som udgangspunkt skal anvende buprenorfin som førstegangsvalg i behandlingen og det præciseres yderligere, at lægerne bør anvende buprenorfin kombineret med naloxon, da dette præparat har en bedre sikkerhedsprofil end behandling med buprenorfin alene.

Læger har et selvstændigt ansvar for at sikre, at personer med et stofmisbrug behandles ud fra gældende regler og på baggrund af en konkret lægelig vurdering af patienten. Herved sikres det, at personer med et stofmisbrug behandles på den mest sikre måde.”

Idet jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse, kan jeg supplerende oplyse, at mens nyere data end de, der for tiden kan indhentes fra Socialstyrelsens stofmisbrugsdatabase, afventes, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indhentet oplysninger fra Statens Serum Institut om, hvad Lægemiddelstatistikregisteret kan vise om brugen af forskellige substitutionspræparater – dog ikke på person eller lægeniveau. Ministeriet har sendt disse oplysninger til Sundhedsstyrelsen, som i øjeblikket overvejer, om der er grundlag for at kontakte kommunerne og de behandlingsansvarlige læger. Sundhedsstyrelsen overvejer desuden, om retningslinjerne på området bør præciseres.

Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen i 2013 indskærpede, at retningslinjerne for substitutionsbehandling skal følges.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Erich Erichsen